




心臓の機能障害の状況および所見（18歳以上用）

（該当するものを○でかこむこと）

1. 臨床所見（                      年                      月                      日）

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ア 動悸（有・無）                           | キ 浮腫（有・無）   |
| イ 息切れ（有・無）                          | ク 心拍数   |
| ウ 呼吸困難（有・無）                         | ケ 脈拍数   |
| エ 胸痛（有・無）                           | コ 血圧（最大                      、最小                      ） |
| オ 血痰（有・無）                           | サ 心音  |
| カ チアノーゼ（有・無）                        | シ その他の臨床所見  |
| ス 重い不整脈発作のある場合は、その発作時の臨床症状、頻度、持続時間等 |   |

2. 胸部X線所見（                      年                      月                      日）



心胸比（                      %）

3. 心電図所見（                      年                      月                      日）

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| ア 陳旧性心筋梗塞  | （有・無）                          |
| イ 心室負荷像  | （有〔右室、左室、両室〕・無）                |
| ウ 心房負荷像  | （有〔右房、左房、両房〕・無）                |
| エ 脚ブロック  | （有・無）                          |
| オ 完全房室ブロック   | （有・無）                          |
| カ 不完全房室ブロック  | （有 第                      度・無） |
| キ 心房細動（粗動）   | （有・無）                          |
| ク 期外収縮   | （有・無）                          |
| ケ S T の低下  | （有                      mV、無）  |
| コ 第I誘導、第II誘導および胸部誘導（ただしV <sub>1</sub> を除く）のいずれかのTの逆転 | （有・無）                          |
| サ 運動負荷心電図におけるS Tの0.1mV以上の低下                          | （有・無・施行不可能）                    |
| シ その他の心電図所見  |                                |
| ス 不整脈発作のある者では発作中の心電図所見（発作年月日記載）                      |                                |

