

毒

キノコに要注意！

食中毒は毎年発生！

食用キノコに**そっくり**な毒キノコが身近にあります

絶対

食用のキノコだと確実に判断できないキノコは

採らない！ 食べない！

売らない！ 人にあげない！

- ◆ キノコを食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を！
- ◆ 気温の高い夏の後に適度な降雨があり、朝晩の気温が低下すると、多くのキノコが発生する可能性があります

ツキヨタケ



中毒症状

食後30分-1時間程度で嘔吐、下痢、腹痛等の中毒を起こす。

間違えやすい食用キノコ

- ・ヒラタケ
- ・ムキタケ
- ・シイタケ

食中毒事件数
(平成25年~令和4年)
NO.1
(118件)

テングタケ



中毒症状：食後30分程で嘔吐、下痢、腹痛など胃腸消化器の中毒症状が現れる。

神経系の中毒症状、瞳孔の収縮、発汗、めまい、痙攣等で、呼吸困難になる場合もあり、1日程度で回復するが、古くは死亡例もある。

NO.3
(17件)

クサウラベニタケ



中毒症状

食後20分-1時間程度で嘔吐、下痢、腹痛等の消化器系の中毒を起こす。唾液の分泌、瞳孔の収縮、発汗などの症状も現れる。

間違えやすい食用キノコ

- ・ウラベニホテイシメジ
- ・ホンシメジ
- ・ハタケシメジ

NO.2
(38件)



おせんちゃん
大津市食糧推進センター

「自分は大丈夫」
と思わず、
必ず確認しましょう

大津市保健所衛生課 食の安全推進係

〒520-0047 大津市浜大津4-1-1 明日都浜大津1F

TEL:077-511-9203 FAX:077-522-7373

MAIL:otsu1441@city.otsu.lg.jp

HP、Twitter：「大津市保健所衛生課」で検索！